



## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM CERKLÁŽ DĚLOŽNÍHO HRDLA

**Vážená paní,**

rozhodla jste se podstoupit výkon cerkláž děložního hrdla. Následující text Vám poskytne informace, které prohloubí Vaše vědomosti o plánovaném výkonu. Před zákrokem obdržíte informační leták **POKYNY PRO PACIENTKY**. Prosím, řiďte se pokyny uvedenými na letáku.

### **Operační postup**

Alternativa výkonu: tento výkon nemá alternativní zákrok

Cerkláž je krátký a poměrně jednoduchý zákrok, který se provádí v celkové anestezii. Je při něm založen steh pod sliznicí hrdla děložního, který děložní hrdlo uzavře.

Po výkonu musí být pacientka sledována alespoň několik hodin, aby odezněl účinek anestezie a bylo možno zhodnotit, zda zásah nevyvolal děložní stahy. Někdy bývá nutné podávat léky tišící bolesti nebo léky, které tlumí děložní stahy. Steh se odstraňuje v 38. týdnu těhotenství, při výskytu komplikací i dříve. O vhodné době k odstranění stehu rozhoduje Váš porodník. Steh je nutné odstranit nejpozději před započítáním porodních bolestí. Samo přestřížení a odstranění stehu není bolestivé a je možno jej provést bez anestezie v poradně.

Okamžitě po operaci nesmíte vzhledem k aplikovaným lékům řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Informujte prosím okamžitě svého lékaře, pokud Vás po vyšetření bude bolet břicho či zjistíte krvácení z rodidel!

### **Komplikace operace**

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. trombóza (vytvoření se krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace nebo po operaci, infekce v operačním poli či infekce močových cest.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření operačního výkonu. Výjimečně může operace vést až k předčasnému porodu. V příštím těhotenství může zjizvený čípek způsobit rigitu branky.

Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám vysvětleny před operací lékařem-anesteziologem.



**Vážená paní,**

naše stručná informace nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

**Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.**

**Ptejte se prosím na vše, co Vám s plánovaným operačním výkonem připadá důležité!**

Jméno pacientky: \_\_\_\_\_

Rodné číslo: \_\_\_\_\_

Vysvětlující pohovor provedl: \_\_\_\_\_

**Podpisem tohoto dokumentu prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace, způsob jejího provedení a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi. Informacím rozumím, jsem si vědoma možných komplikací a další dotazy nemám. Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ Podpis pacientky: \_\_\_\_\_