



INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM PERINEOPLASTIKA

Vážená paní,

rozhodla jste se podstoupit výkon perineoplastika. Následující text Vám poskytne informace, které prohloubí Vaše vědomosti o plánovaném výkonu. Před zákrokem obdržíte informační leták **POKYNY PRO PACIENTKY**. Prosím, řiďte se pokyny uvedenými na letáku.

Operační postup

Perineoplastika je plastika poševního vchodu. Provádí se z důvodu jeho uvolnění, pocitu přílišné velikosti, při snížené elasticitě podslizničního vaziva, vrozených vadách nebo získaných deformitách poševního vchodu, často také po porodu.

Před operací je nutno podstoupit kompletní interní a laboratorní vyšetření a vyšetření u gynekologa. Pokud je vše v pořádku, můžete podstoupit operaci. Minimálně měsíc před operací není dovoleno užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, které snižují srážlivost krve a dále léky na roztažení cév (vazodilatancia). Před operací byste neměla trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou, neměla byste menstruat, kojít ani být brzy po porodu. Minimálně šest hodin před operací se nesmí jíst, pít ani kouřit. Před operací Vás navštíví anesteziolog, který s Vámi probere problematiku a možné komplikace anestezie při plánované operaci.

Operace se provádí na operačním stole v tzv. gynekologické poloze. Operace pro pacientku není nijak extrémně náročná, trvá dle náročnosti od 30 minut do jedné hodiny. Operátor nejdříve desinfikuje a zarouškuje operovanou krajinu. Poté provede řez v oblasti poševního vchodu (perinea – oblast mezi zevními pohlavními orgány a řitním otvorem) a provede rekonstrukci a sešití tkání vstřebatelnými stehy.

Možné komplikace a rizika

Žádný lékař Vám nemůže zaručit výkon absolutně bez rizika. Komplikací popisovaných po této operaci není mnoho. Velmi vzácně se vyskytují všeobecné komplikace chirurgických výkonů, jako jsou trombózy (vznik krevní sraženiny v cévě), embolie (uzávěr cévy například z uvolněné krevní sraženiny), poranění sousedních cév či nervů. Vzácně může dojít k většímu krvácení, infekci, otoku nebo bolesti, kterým lze většinou předejít poctivým dodržováním pooperační péče.

Po perineoplastice se doporučuje minimálně po dobu jednoho týdne zvýšená hygiena operované oblasti, nejlépe opakované sprchování. První měsíc, před úplným zhojením, se nedoporučuje nadměrná tělesná zátěž (zejména zvedání těžkých předmětů) a pohlavní styk.

Další komplikace mohou nastat v souvislosti s narkózou, o čemž Vás informuje anesteziolog.



Vážená paní,

naše stručná informace nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

Ptejte se prosím na vše, co Vám s plánovaným operačním výkonem připadá důležité!

Jméno pacientky: _____

Rodné číslo: _____

Vysvětlující pohovor provedl: _____

Podpisem tohoto dokumentu prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace, způsob jejího provedení a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi. Informacím rozumím, jsem si vědoma možných komplikací a další dotazy nemám. Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

V _____ dne _____ Podpis pacientky: _____