



## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM REVIZE DUTINY DĚLOŽNÍ

**Vážená paní,**

pro zjištění možných příčin a odpovídající léčbu Vám byl doporučen operační výkon revize dutiny děložní. Následující text Vám poskytne informace, které prohloubí Vaše vědomosti o plánovaném výkonu. Před zákrokem obdržíte informační leták **POKYNY PRO PACIENTKY**. Prosím, řiďte se pokyny uvedenými na letáku.

### **Operační postup**

Alternativa výkonu: tento výkon nemá alternativní zákrok.

Před operačním výkonem se nesmí minimálně šest hodin jíst, pít ani kouřit. Před operací Vás navštíví anesteziolog, který s Vámi probere problematiku a možné komplikace anestezie při plánované operaci. Tento výkon se provádí v celkové anestezii. Při revizi dutiny děložní se odstraňují z dělohy zbytky plodového vejce s obaly a následuje vyčištění dělohy. Cílem je uvedení dutiny děložní do stavu stejného jako před otěhotněním. Operační přístup je volen přes pochvu, kudy je do dutiny děložní zavedena podtlaková a vybaven obsah dutiny děložní. Výkon trvá asi 15 minut. Po 10. týdnu těhotenství již plodové vejce s obaly pro jeho velikost nelze odstranit odsátím, proto se volí postup pomocí dilatace děložního hrdla a odstranění obsahu pomocí kyrety. Po operačním zákroku je nutné dodržovat režim snižující možnost výskytu komplikací – infekce a krvácení. Je nutné dbát zvýšené hygieny (lépe sprchy než koupele). Po dobu minimálně 2-3 týdnů po výkonu se nedoporučuje zvýšená tělesná zátěž, pohlavní styk či zavádění tamponů do pochvy. Při bolestech v podbřišku, silném krvácení, horečkách či jiných problémech souvisejících s výkonem se neprodleně obraťte na lékaře.

### **Komplikace operace**

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. trombóza (vytvoření se krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení nebo infekce.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření operačního výkonu. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy.



Vážená paní,

naše stručná informace nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

**Ptejte se prosím na vše, co Vám s plánovaným operačním výkonem připadá důležité!**

Jméno pacientky: \_\_\_\_\_

Rodné číslo: \_\_\_\_\_

Vysvětlující pohovor provedl: \_\_\_\_\_

**Podpisem tohoto dokumentu prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace, způsob jejího provedení a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi. Informacím rozumím, jsem si vědoma možných komplikací a další dotazy nemám. Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ Podpis pacientky: \_\_\_\_\_